

## Literatuur bij de rubriek Best Practice

- College voor zorgverzekeringen/geneesmiddelen Informatie project (GIP) (2000). *GIPeilingen 1998, Kengetallen farmaceutische hulp*. CvZ: Amstelveen.
- College voor zorgverzekeringen (2007). *Farmacotherapeutisch Kompas*.
- DGV, Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik (2005). *Stoppen met benzodiazepinen*. Gezondheidsraad (1998). *Naar een doelmatig gebruik van benzodiazepinen*. Den Haag: Gezondheidsraad.
- Gorgels, W.J.M.J., Oude Voshaar, R.C., Moll, A.J.J., Zitman, F.G. (red.) & Lisdonk, E.H. van de (2002). *Terugdringen van chronisch gebruik van benzodiazepinen*. Nijmegen: Afdeling Huisartsgeneeskunde, UMC St Radboud.
- Gorissen, M. (1999). Wat niet goed is opgeslagen, kan niet worden teruggehaald. Geheugenstoornissen bij benzodiazepinegebruik. *Pharm. Weekblad* 134 (8), 274-8.
- Herings, R.M.C., Stricker, B.H.Ch. & Boer, A. (1995). Benzodiazepines and the risk of falling leading to femur fractures. Dosage more important than elimination half-life. *Arch.Int.Med.* 155, 1801-7.
- Herings, R.M.C. (2001). 'Ik ben zo gevallen'. Benzodiazepinen in relatie tot (ongevallen). *Pharm. Weekblad* 136 (49), 1840-2.
- Kan, C.C., Breteler, M.H.M, Timmermans, E.A.Y., Ven, A.H.G.S. van der & Zitman, F.G. (1999). Scalability, reliability and validity of the benzodiazepine Dependence Self-Report Questionnaire. *Comprehensive Psychiatry* 40 (4), 283-291.
- Knoop, H., Kan, C.C., Mickers, F.C. & Barnhoorn, D. (2006). Het voorspellen van het succes van benzodiazepineafbouw: mythes of klinische wijsheden? *Tijdschrift voor Psychiatrie* 48 (9), 695-703.
- Knuistingh Neven, A., Lucassen, P.L.B.J. & Bonsema, K. (2005). NHG-standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen. Eerste herziening. *Huisarts en Wetenschap* 48 (8), 402-15.
- Lagro-Janssen, A.L.M. & Liberton, I.J.W. (1993). Benzodiazepinen: profielen van chronische gebruikers in een huisartsenpraktijk. *Ned Tijdschr Geneesk* 137 (39), 1969-73.
- Meeuwissen, J.A.C. & Weeghel, J. van (2003). *Ontwikkeling, evaluatie en implementatie van een stepped care-programma voor depressie*. trecht: Trimbos-instituut.
- Migchelbrink, F. (2006). *Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn*. Amsterdam: Uitgeverij SWP. *Multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen 2003*. Utrecht: Landelijke stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnen in de GGZ.
- Oude Voshaar, R.C., Gorgels, W.J.M.J. & Moll, A.J.J. (2001). Behandelmethoden om langdurig benzodiazepinegebruik te staken. *Ned Tijdschr Geneesk* 145 (28), 1347-50.
- Praag, H.H. van (2000). *Psychofarmaca*. Assen: Van Gorcum.
- Ried, L.D., Johnson, R.E. & Gettman, D.A. (1998). Benzodiazepine exposure and functional status in older people. *Journal of the American Geriatrics Society* 46, 71-76.
- Schuurmans, A. (2000). *Benzodiazepinegebruik door ouderen*. Stichting DGV.
- Stoele, M., Luijendijk, H., Tiemeier, H., Heeringa, J., & Jansen, H. *Langdurig gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen door ouderen* (2004). Een kwantitatieve longitudinale analyse en een kwalitatieve survey onder gebruikers en voorschrijvende artsen in Rotterdam.
- Tinke, J.L. & Griens, A.M.G.F. (2005). *Data en feiten 2005*. Den Haag: Stichting Farmaceutische Kengetalen.
- Valk, V. de (2004). CVZ wil slaap- en kalmeringsmiddelen verder terugdringen. 1,86 miljoen Nederlanders is teveel. *Pharm. Weekbl* 47 (1), 26-37.
- Verburg, H. & Rest, E. (2005). *Programma's in de GGZ*. Utrecht: Trimbos-instituut.
- Verburg, H., Boerema, I. & Wiersma, D. (2006). *Zorgprogramma's van papier naar praktijk*. Handreiking invoering zorgprogramma's. Utrecht: Trimbos-instituut.
- Vissers, F.H.A.J.A. (1998). *Gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen in het dagelijks leven. Determinanten, gevolgen en de rol van de huisarts* (dissertatie). Universiteit Maastricht.
- Wijngaarden, B. van, Wennink, H.J. & Kok, I. (2003). *Klinische uitkomstindicatoren in de GGZ en verslavingszorg*. In Nederland verkrijgbare instrumenten getoetst op betrouwbaarheid, validiteit en toepasbaarheid. Utrecht: Trimbos instituut.